

¿Qué saben los padres de las vacunas que le administramos a sus hijos?

José Antonio Forcada Segarra
Coordinador de los Grupos de trabajo en Vacunaciones y Riesgo Biológico
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
Responsable de Docencia y Calidad
Centro de Salud Pública de Castellón
pepeforcada@hotmail.com

Desde la implantación de las campañas de vacunación en los años 60 y la posterior incorporación de los Calendarios Oficiales de Vacunaciones, las coberturas de vacunación frente a las enfermedades inmunoprevenibles ha alcanzado unas tasas que en los primeros años de vida se consideran óptimas.

En las edades de la adolescencia, y por diversas circunstancias, estas tasas disminuyen, a pesar de los esfuerzos que desde las administraciones públicas y desde las Sociedades científicas se vienen desarrollando.

- Espaciamiento entre las dosis.
- Menor importancia que se otorgan a las vacunaciones por la desaparición de las enfermedades vacunables.
- Poca concienciación de captación entre los profesionales sanitarios.

¿Por qué son las tasas mayores en los primeros años de la vida del niño/a?

- Mayor número de visitas a pediatría
- Mayor interés en la protección de la salud del lactante/niño pequeño
- Consideración de las vacunaciones como "obligatorias"
- Mayor concienciación y captación entre los profesionales de pediatría.

¿Y los que no vacunan a sus hijos?

- Miedo a los efectos secundarios graves de las vacunas.
- Terapias naturistas
- Falta de percepción de los beneficios de la inmunidad grupal

Revista Salud y Bienestar

Foros Ju

SALUD Y BIENESTAR

Los padres contrarios a la vacunación infantil tienen una baja percepción del riesgo que asumen sus hijos

Publicado el 26 marzo 2010 por Fat

AEP

España cuenta con unas tasas de vacunación de la población infantil muy elevadas, que alcanzan en torno al 95%. En general, existe una conciencia muy desarrollada sobre el importante papel de las vacunas y su gran eficacia en la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles. Sin embargo, algunas personas siguen siendo reacias a su utilización y permanecen firmes en su creencia de que es más beneficioso para sus hijos no vacunarles. "Diversos estudios apuntan que detrás de la decisión de no vacunar a un hijo hay generalmente miedo a que la inmunización cause un efecto secundario grave", explica el doctor Diego Van Esso, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) durante su intervención en las Jornadas de Vacunas de

REVISTA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
EXLIBRIS ediciones
AEPap

Usuario: Contraseña: Iniciar sesión Registrarse (recuperar contraseña)

• La Revista • • Número Actual • • Números Anteriores • • Último Suplemento • • Suscripción • • Noticias •

Compartir | Artículo sin valoraciones

Comunicaciones orales Volver al índice >>

C-4. ¿Qué opinan los padres sobre la eficacia y seguridad de las vacunas de sus hijos?

Autores:
Fernández Campos MA[a], Seijas Vázquez L[b], Azor Martínez E[c], Pérez Ortega MJ[d], Garzón Cabrera MI[e]
[a]CS Alborán-UGC Ciudad Jardín. Almería. España.
[b]CS Virgen del Mar-UGC Virgen del Mar-Los Molinos, Distrito Sanitario Almería. Almería. España.
[c]CS Virgen del Mar-UGC Virgen del Mar-Los Molinos, Distrito Sanitario Almería. Almería. España.
[d]Residente de Pediatría. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.
[e]Residente de Pediatría. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Referencia para citar este artículo:
Fernández Campos MA, Seijas Vázquez L, Azor Martínez E, Pérez Ortega MJ, Garzón Cabrera MI. C-4. ¿Qué opinan los padres sobre la eficacia y seguridad de las vacunas de sus hijos?. Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12(Supl 19):e59.
Publicado en Internet: 20/11/2010

Introducción y objetivos. La medida coste-efectividad más eficaz de Salud Pública en la prevención de las enfermedades infecciosas ha sido la aparición y

Resultados. El 100% niega tener creencias personales, culturales o religiosas en contra de las vacunas. El 85% las considera una medida de salud muy importante. El 44% las considera muy seguras, el 40% seguras y un 16% algo seguras. El 100% piensa que las ventajas superan los riesgos.
El 100% afirmaba haber vacunado a sus hijos con las vacunas correspondientes a su edad según el calendario del Servicio Andaluz de Salud y el 98% los había vacunado además con las vacunas no sistemáticas.
La decisión de vacunar a sus hijos se había tomado de modo propio en el 35,5%, en el 40% por consejo de su pediatra, y el 24,5% restante elegían ambas opciones.

UNIVERSITY OF MICHIGAN NOTICIAS EN ESPAÑOL

PORTAL EN ESPAÑOL | ADMISIONES Y ASUNTOS ACADÉMICOS | NOTICIAS EN ESPAÑOL

Comunicados de Prensa
Archivo
Artículos Seleccionados
El Portal
Personal

DIRECCIÓN:
535 W William, Suite 2100
Ann Arbor, MI 48103-4943
EEUU
Tel: 1-734 763-0368

Facebook
Twitter
YouTube

Más de la mitad de los padres hispanos piensan vacunar a sus hijos contra la gripe H1N1

30 Septiembre, 2009

en inglés

Una encuesta nacional del hospital Mott Children's Hospital sobre la salud infantil encuentra que menos de la mitad de los padres piensan vacunar a sus niños contra la gripe H1N1 (también conocida como la gripe porcina) a pesar de un mayor riesgo de enfermedad. Es más probable que los padres hispanos vacunen a sus niños.

ANN ARBOR, Michigan - Como empieza un año nuevo escolar, la gripe H1N1 se ha vuelto más activa por todos los estados unidos, sobre todo entre los niños. Se espera que una nueva vacuna recomendable para niños que combate la gripe estará disponible en octubre. ¿Pero los padres harán vacunar a sus niños?

Sólo el 40 % de los padres indican que harán vacunar a sus niños contra la gripe H1N1 mientras que el 54 % indican que harán vacunar a sus niños contra la gripe estacional. Entre los padres que no piensan vacunar a sus niños contra la gripe H1N1, el 46 % indican que se preocupan de que sus niños contraigan la gripe, mientras que el 20 % creen que la gripe H1N1 no es grave.

PADRES, MÁS PREOCUPADOS POR PAÑALES QUE POR VACUNAS

Los padres de hoy conocen más de pañales que de vacunas para sus hijos, y lo que más les preocupa cuando los vacunan es el dolor, el llanto y los efectos secundarios que produce el pinchazo. Y aunque el mundo ha avanzado en el tema, expertos advierten que **el valor de las vacunas se está perdiendo**, porque los adultos piensan que **las enfermedades están controladas por la ciencia.**

Estas son las conclusiones de la primera fase del estudio Mi generación, realizado en diciembre del 2004 por Ipsos (multinacional que analiza mercados), contratada por el laboratorio GlaxoSmithKline.

El informe se elaboró a través de entrevistas directas a 1.600 padres con hijos menores de un año en ocho países (Alemania, Italia, Holanda, Francia, Bélgica, Argentina, Brasil y Chile).

PADRES, MÁS PREOCUPADOS POR PAÑALES QUE POR VACUNAS

A pesar de que el 85 % de los padres dijo que lo que más le importa es la salud de su hijo, seguido de alimentación, vacunación y educación, aceptan que su principal vacío está en el conocimiento de qué tipo de biológicos son importantes para sus niños.
El estudio revela que, mientras el 65 % de los padres le interesa y sabe de pañales, solamente el 20 % dice que conoce sobre qué tipos de vacunas hay en el mercado y cuáles son los efectos de estas en el organismo del niño.
Así mismo, el informe concluye que las principales preguntas de los padres con relación a las vacunas son los efectos secundarios (69 %), seguido del objetivo, la necesidad, la eficiencia y la seguridad.
También se detectó que casi la mitad, el 46 %, afirmó que sentía "ansiedad" en el momento de ir al médico a vacunar a sus hijos, principalmente porque piensan que el pequeño va a sufrir y tienen dudas sobre la seguridad de los biológicos.

Enfermedades

Página anterior

Padres creen que hay un nexo entre las vacunas y el autismo

El 25 por ciento de los padres de familia estadounidenses consideran que las vacunas provocan autismo en los pequeños.

Carla K. Johnson | 2010-03-09

Califica este artículo: | Calificación promedio: | Tamaño del texto:

Imprimir | Enviar | Comentar | Guardar | Vincular a

CHICAGO (AP). Uno de cada cuatro padres de familia en Estados Unidos cree que algunas vacunas provocan autismo a niños sanos, pero aún así varios de los que sostienen esa creencia piensan que sus hijos deben ser vacunados.

La mayoría de los padres sigue cumpliendo con los consejos de los doctores de sus hijos, de acuerdo con un estudio basado en una encuesta de 1.552 padres y madres. Investigaciones extensas no han encontrado ninguna conexión entre el autismo y las vacunas.

"Nueve de cada 10 padres de familia creen que la vacunación es una buena forma de prevenir enfermedades de sus hijos", dijo el autor principal, el doctor Gary Freed de la Universidad de Michigan. "Por suerte, sus preocupaciones no rebasan el peso de su decisión de aplicar las vacunas, para que sus hijos puedan estar protegidos de enfermedades que pueden ser mortales".

En 2008, los niños en edad escolar no vacunados contribuyeron a brotes de sarampión en

En el país hay un promedio de un niño por cada 150 con autismo. **Archivo**

1/1

El VIH puede ocultarse en la médula ósea

Si tienes un bebé, no fumes

Uno de cada cuatro padres de familia en Estados Unidos cree que algunas vacunas provocan autismo a niños sanos, pero aún así varios de los que sostienen esa creencia piensan que sus hijos deben ser vacunados.
La mayoría de los padres sigue cumpliendo con los consejos de los doctores de sus hijos, de acuerdo con un estudio basado en una encuesta de 1.552 padres y madres. Investigaciones extensas no han encontrado ninguna conexión entre el autismo y las vacunas.
"Nueve de cada 10 padres de familia creen que la vacunación es una buena forma de prevenir enfermedades de sus hijos", dijo el autor principal, el doctor Gary Freed de la Universidad de Michigan. "Por suerte, sus preocupaciones no rebasan el peso de su decisión de aplicar las vacunas, para que sus hijos puedan estar protegidos de enfermedades que pueden ser mortales".

proyecto VACSATC

1) tanto los agentes infecciosos como los rumores y preocupaciones sobre la seguridad vacunal carecen de fronteras y los problemas no pueden ser resueltos desde un único país.
2) Se pueden realizar "mejores mejoras" sobre la experiencia construida entre la colaboración de varios países.
3) La participación de centros de excelencia liderará un progreso en la calidad y una rápida diseminación de las mejores prácticas.
4) La colaboración está en el contexto del uso racional de recursos, evitando la duplicidad de trabajo.
5) Las iniciativas en seguridad vacunal están a menudo dotadas de forma inadecuada.

Actividades específicas del proyecto son:

1) desarrollar una encuesta europea sobre actitudes de inmunización.
2) Diseñar una herramienta de formación pregrado en vacunas.
3) Desarrollo y mantenimiento de páginas Web sobre vacunas como sitios de referencia para público general y profesionales sobre el tema.

Estudios de seguimiento de encuestas de opinión verifican que las madres piensan que la vacuna triple vírica (TV: sarampión, rubéola y paperas) protege contra enfermedades que nos son consideradas graves. Las encuestas también han mostrado que la TV es la vacuna que se considera menos segura.

Por otro lado, desde el año 2002, Smith, Yarwood and Salisbury encuentran en el Reino Unido, que la proporción de padres que creen que la vacuna triple vírica supone un mayor riesgo que las enfermedades contra las que protege ha decaído del 24% al 14%. Y que la proporción de retractores estrictos permanece estable en un 6%, con el hallazgo más relevante que supone el incremento sostenido y gradual de padres que opinan que esta vacuna es segura o con un mínimo riesgo 60% en el 2002 al 74% en los momentos actuales. Claramente, los padres se encuentran en un debate interno entre su percepción sobre la seguridad de una determinada vacuna y la protección que genera frente al peligro de la enfermedad contra la que protege. En cualquier caso, la situación en otros países y cómo está cambiando no es bien conocida.

Las consecuencias de las bajas tasas de vacunación no sólo afectan a los niños no vacunados, sino al resto de la sociedad. La "inmunidad de rebaño" está amenazada y re-ocurren brotes de enfermedades que se pensaban estar bajo control. El proceso de toma de decisiones en torno a la vacunación infantil es complejo.

Los padres requieren información actualizada, adaptada a sus requerimientos individuales y proveída por profesionales sanitarios bien informados.

El papel, por tanto, del personal sanitario bien formado en aportar consejo y discutir sobre el tema con padres preocupados es muy importante.

CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES/MADRES SOBRE LA VACUNACIÓN DE SUS HIJOS/AS

María García Colomer
Amparo Palomar Lara
José Antonio Forcada Segarra

Resumen

El objetivo de este estudio es el de **evaluar** el grado de **información** que poseen padres y madres sobre el **calendario vacunal** de sus hijos/as, así como la actuación ante posibles efectos secundarios tras la administración de las vacunas.

Introducción

La vacunación constituye una actividad de prevención primaria muy efectiva.

La edad pediátrica es el periodo de la vida en el que se administran más vacunas.

En la actualidad gran cantidad de información sobre la vacunación del niño dirigida a los padres puede obtenerse de diferentes fuentes, pero éstas pueden ser erróneas o no accesibles.

Calendario vacunal de la Comunidad Valenciana

	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	15 meses	18 meses	6 años	11 años	14 años
C. Valenciana	H B	H B DTPa VPI Hib Men C	DTPa VPI Hib	H B DTPa VPI Hib Men C	SRP	DTPa VPI Hib Men C	Tdpa SRP	VAR*	Td VPH**

*Sólo niños no vacunados previamente que no han padecido la varicela.
** Sólo para niñas. 3 dosis con pauta 0, 1-2, 6 meses

Objetivos

Objetivo principal: Evaluar el grado de información que poseen padres y madres sobre las vacunaciones y el calendario vacunal de sus hijos/as.

Objetivo secundario: Demostrar la necesidad de mejorar la información y formación de los padres/madres ante los posibles efectos secundarios y complicaciones tras la administración de las vacunas.

Material y métodos

Diseño del estudio: Estudio descriptivo en el que se utiliza como herramienta de trabajo un cuestionario anónimo.

Ámbito del estudio: CS Pintor Sorolla de Castellón.

Población del estudio: Padres y madres que acuden a la consulta de pediatría o enfermería de dicho centro con cita programada o a demanda para la vacunación de sus hijos desde el 15 de Junio de 2010 al 15 de agosto del mismo año.

Resultados

Pregunta número 1:

Muestra

Respecto al sexo un 20.9% de las personas que contestan nuestro cuestionario son padres frente a un 79.1% que son madres.



Resultados

Pregunta número 2:

Muestra

Respecto a la edad del niño/a el porcentaje más elevado 25.4%, corresponde al rango de edad de los dos meses, seguido de un 15.9% que corresponde al rango de edad de 15-18 meses.



Resultados

Pregunta número 3: Respecto a las vacunas que va a recibir su hijo/a en general, hemos observado que el desconocimiento va en aumento a mayor edad del niño/a, esto se refleja en dos rangos de edades: a los 2 meses, un 86.3% de los padres/madres conocen las vacunas que les van a administrar a sus hijos, ya que en las primeras visitas es cuando reciben la mayor cantidad de información. Este valor contrasta con el obtenido en los rangos de edad de 3 a 6 años, donde el número de revisiones disminuye además de espaciarse entre ellas, por lo que un 93% de los padres/madres desconocen las vacunas que deben o no administrar a sus hijos/as.

Resultados

CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS
A RECIBIR A LOS 2 MESES



CONOCIMIENTO DE LAS VACUNAS
A RECIBIR A LOS 3 - 6 AÑOS



Resultados

Pregunta número 4: Respecto a si le han administrado alguna vacuna de pago, la mayoría, un 50.7% han contestado que no, coincidiendo con la justificación de los padres/madres sobre la situación económica que estamos atravesando.
El 49,3% han administrado alguna otra vacuna, 9 (4'5%) han administrado la vacuna frente a rotavirus, 18 (9%) la vacuna frente a neumococo y 22 (10,9%) la vacuna frente a varicela. 40 (19,9%) han administrado rotavirus y neumococo, 9 (4,5%) han administrado neumococo y varicela y 1 (0'5%) ha administrado las tres vacunas.
Así, 50 niños/as (24'5%) han recibido la vacuna frente a rotavirus, 59 (29,4%) la vacuna frente a neumococo y 32 (15,9%) la vacuna frente a la varicela.

Resultados


60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Rotavirus
Neumococo
Varicela
Ninguna
Vacunas de pago

Resultados

Pregunta número 5: Respecto a si conocen la fecha de la próxima vacunación de su hijo/a, el porcentaje más elevado, un 49.8% contestan que no, aunque un 47.8%, contestan que sí.

Por edades, se observa que a menos edad, mayor conocimiento de las edades de las próximas vacunas, pasando de un 78'4% y un 100% de conocimiento a las 2 y 4 meses respectivamente, a un 71'4% y 96'7% de desconocimiento a los 3-4 y 5-6 años de edad.

Resultados

Pregunta número 6: Respecto a si conocen los efectos adversos que puede sufrir su hijo/a tras la administración de la vacuna, el efecto más conocido y destacado por los encuestados es la fiebre, seguida del malestar general, dolor local y enrojecimiento. El resto de efectos están muy igualados entre sí.

Un 20,4% reconocen solo la fiebre como efecto no deseado, un 19,9% reconocen la fiebre y el malestar general, un 9% los anteriores más el enrojecimiento y un 8% la fiebre y el dolor local.

194 (96,5%) han mencionado la fiebre, 99 (49,2%) han mencionado el malestar general, 93 (46,3%) el dolor local y 67 (33,3%) el enrojecimiento.

Resultados


100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
efectos adversos
Fiebre
Malestar general
Dolor local
Enrojecimiento

Resultados

Pregunta número 7: Respecto a la actuación que deben seguir los padres/madres frente a la aparición de algunos de estos efectos adversos la mayoría, un 48.8% le administrarían a su hijo/a antipiréticos y lo llevarían a urgencias, un 18'4% le administrarían solo antipiréticos, un 10,4% le administrarían antipiréticos y acudirían al pediatra y un 9% le administrarían antipiréticos, calmantes y acudirían a urgencias.

Un 93'6% le administrarían antipiréticos y un 63'8% acudirían a urgencias.

Resultados

Pregunta número 8: Respecto a si conocen el horario de vacunación de su centro de salud, un 82.6% responde que sí, frente a un 15.9% que responde que no.

Resultados

Pregunta número 9: Respecto a si han leído en la cartilla de salud de su hijo/o o en otro documento el calendario oficial de vacunaciones de la Comunidad Valenciana, un 51.7%, conoce el calendario vacunal, frente a un 34.8% que no lo conoce.

No se han observado diferencias significativas por rango de edad.

Resultados

Pregunta número 10: Respecto a quien dirigen sus dudas y preguntas sobre las vacunas, hay un empate entre los porcentajes más altos, un 43.8% a la enfermero/a y un 43.8% a ambos (enfermero/a y pediatra), frente a un 12.4% que sólo preguntan al pediatra.

Resultados


50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
¿A quien pregunta las dudas?
Enfermero/a
Enf/pediatra
Pediatra

Conclusiones y discusión

- La mayoría de las personas encuestadas son madres por lo que son ellas las que más información poseen a cerca del calendario vacunal de su hijo/a.
- A medida que aumenta la edad del niño/a, aumenta el distanciamiento entre las revisiones, disminuyendo así la información respecto a la vacunación de sus hijos/as.
- El efecto adverso más nombrado por los encuestados es la fiebre, seguida de malestar general, dolor local y enrojecimiento.

Conclusiones y discusión

- La mayoría de los encuestados optan en primer lugar por administrar a sus hijo/as antipiréticos y si esta medida no es eficaz pasan a llevar a sus hijos/as a urgencias. Esta actuación provoca una utilización inadecuada de este servicio.

- Por tanto, se detecta la necesidad de mayor actividad informativa y formativa desde las instituciones sanitarias y desde los equipos de atención primaria en las visitas programadas de las revisiones.

Conclusiones y discusión

- Se deberían diseñar protocolos de información y formación a adoptar por parte de los profesionales que intervienen en las actividades de vacunaciones y educación para la salud.

- Para finalizar este trabajo cabe destacar la gran labor tanto de la enfermera pediátrica como del pediatra de Atención Primaria para ofrecer a los padres los conocimientos y pautas a seguir respecto al proceso de vacunación y posibles consecuencias.

Muchas gracias por vuestra atención